Línea de Biológicos FORTE de Laboratorios CALBOS

TUBER FORTE

PPD BOVINA AVIAR

LÍNEA FORTE

CUIDAMOS tu INVERSIÓN

Prevención y Protección MÁXIMA

calbosvzla

CALBOS
Saúde Animal

TUBER **FORTE PPD BOVINA**

Tuberculina PPD Bovina Derivado proteico purificado de la tuberculina bovina (3250 UI / 0,1 ml).

Reactivo para el diagnóstico de tuberculosis bovina.

Composición:

Derivado proteico purificado de tuberculina (PPD) 3250 UI / 0,1 ml.

Indicaciones de Uso:

Reactivo para diagnóstico por inoculación intradérmica de tuberculosis en bovinos y en suinos.

EN BOVINOS:

Prueba Anocaudal: *La dosis de tuberculina PPD se inocula en el tercio medio del pliegue anocaudal interno, a unos seis centímetros de la base de la cola y en el centro del pliegue.*

Prueba Cervical Simple: *El lugar de inoculación es el tercio medio del cuello, teniendo la precaución de cortar el pelo con tijera o máquina, en el sitio de la inyección, en un área de 5 centímetros de diámetro.*

Prueba Cervical Comparativa: *El lugar de la aplicación es el tercio medio del cuello, inoculando la PPD aviar a unos 10 cm del ligamento de la nuca y la PPD bovina a unos 12 cm debajo de la anterior, teniendo en cuenta en ambos casos el haber cortado el pelo, como fue indicado en el caso de la prueba cervical simple.*

EN SUINOS:

El lugar de inoculación es la base de la oreja, teniendo en cuenta que la tuberculina PPD bovina se inyecta en el lado derecho y PPD aviar en el lado izquierdo.

Especies en las que se destina:

Bovinos

Suinos

Vía de Administración:

Vía intradérmica, variando las zonas de acuerdo a la especie y al método empleado.

Dosificación:

BOVINOS y SUINOS: *0,1 ml.*

Conservación:

A temperaturas de 2 °C - 8 °C | No Congelar.

Presentación: **5 ml - 50 DOSIS**

CALBOS
Saúde Animal

TUBER ***FORTE PPD AVIAR***

Reactivo para diagnóstico de tuberculosis aviar y para diagnóstico diferencial de tuberculosis en bovinos, suinos, caprinos y ovinos.

EXCIPIENTES

Especies en las que se destina:

- *Bovinos*
- *Suinos*
- *Caprinos*
- *Ovinos*
- *Aves*

Vía de Administración:

Vía Intradérmica, variando la zona de acuerdo a la especie y al método empleado.

Dosificación:

BOVINOS, SUINOS, CAPRINOS y OVINOS: *0,1 ml.*

AVES: *0,05 ml.*

Composición:

Derivado proteico purificado de tuberculina (PPD) 2.500 UI / 0,1 ml.
Colorante rojo ponceau 2%.

Indicaciones de Uso:

Reactivo para el diagnóstico por inoculación intradérmica de aviar y para diagnóstico diferencial de tuberculosis en bovinos, caprinos y ovinos.

EN BOVINOS:

Prueba Cervical Comparativa: *El lugar de aplicación es el tercio medio del cuello, inoculando la PPD aviar a unos 10 cm del ligamento nucal y la PPD bovina a unos 12 cm debajo del anterior, teniendo en cuenta en ambos casos el haber cortado el pelo previamente, la lectura se realizará a las 72 horas.*

EN SUINOS:

El lugar de inoculación es la base de la oreja, teniendo en cuenta que la tuberculina PPD bovina, se inocula del lado derecho y la PPD aviar del lado Izquierdo, con lectura a las 48 horas.

EN CAPRINOS y OVINOS:

Se puede aplicar satisfactoriamente en el pliegue de la cola, en la región palpebral o en la tabla del cuello. La técnica de aplicación e interpretación es similar a la de los bovinos. La lectura se realiza a las 72 horas.

EN AVES:

Se inoculan 0,05 ml por la vía Intradérmica en una de los barbillones, dejando el otro como testigo. La lectura se realiza a las 48 horas.

Conservación:

A temperaturas de 2 °C - 8 °C | No Congelar.

Presentación: ***5 ml - 50 DOSIS***

CALBOS
Saúde Animal

Línea de Biológicos FORTE
de Laboratorios CALBOS

LÍNEA FORTE

CUIDAMOS tu INVERSIÓN

Prevención y Protección
MÁXIMA

ESCANEA EL CÓDIGO QR
y visualiza la info del producto

TU FINCA SANA CON CALBOS Saúde Animal

PRODUCTOS

Importados por:

suply equinos
RIF: J-29522498-2

suplyequinosca@gmail.com
calbosvenezuela@gmail.com

Laboratorios CALBOS LTDA - VENEZUELA

calbosvzla