

Ficha Técnica

Ocladerm



Composición: Oclacitinib (como Maleato)* 3,5 %

Cada Comprimidos de 103 mg :Oclacitinib (como Maleato)* 3,6 mg

Cada Comprimidos de 154 mg: contiene Oclacitinib (como Maleato)* : 5,4 mg

Cada Comprimidos de 457mg: Contiene Oclacitinib (como Maleato)* 16,0 mg

Indicaciones: El producto está indicado para el tratamiento del prurito relacionado con dermatitis alérgica en perros y para el control de la dermatitis atópica en perros de al menos 12 meses de edad.

Especies de Destino: Caninos.

Vías de Administración, Dosis y Modo de Uso: Vía de administracin oral . **Dosis y Modo de uso:** debe administrarse a razón de 0,4 - 0,6mgde oclacitinib / Kg de peso corporal, por la vía oral, dos veces por día (cada 12 horas), por hasta 14 días. Luego se debe pasar a una dosis de mantenimiento de una toma diaria (0,4 - 0,6 mg/Kg cada 24 horas). El comprimido se puede administrar con o sin el alimento. La duración del tratamiento será variable según la evolución del cuadro clínico y criterio del médico veterinario actuante

Tabla orientativa de dosis

Rango de Peso (kg)	Presentación		
	Comprimido x 3,6 mg	Comprimido x 5,4 mg	Comprimido x 16 mg
3,0 – 4,4	½		
4,5 – 5,9		½	
6,0 – 8,9	1		
9,0- 13,4		1	
13,5 – 19,9			½
20,0 – 26,9		2	
27,0 – 39,9			1
40,0 – 54,9			1 ½
55,0 – 80,0			2

Contraindicaciones y Precauciones: No usar en casos de hipersensibilidad a Oclacitinib. No usar en perros menores de 12 meses de edad o menores de 3 kg de peso corporal. No usar en perros con inmunosupresión o hiperadrenocorticismos. No usar en perras gestantes o en lactación, pues no han sido estudiados los efectos de oclacitinib en estos estados ni en machos destinados a la reproducción. **Precauciones:** Ocladerm modula el sistema inmune y puede incrementar la susceptibilidad a infecciones y desarrollo de papilomas

Presentación: Comprimidos monorrannurados de 103, 154 y 457 mg conteniendo 3,6 – 5,4 – 16,0 mg de Oclacitinib respectivamente. Estuche de cartón (para los blisters) con su prospecto conteniendo 2 blisters de 10 Comprimidos cada blíster, 20 Comprimidos.

Vida Útil: 24 meses a partir de la fecha de elaboración

Almacenamiento: Almacenar a temperatura entre 15 y 30° C al abrigo de la luz solar directa en su envase original. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. No almacenar junto a alimentos o bebidas. Los envases utilizados deberán ser descartados según la legislación vigente..