

Endecto **PLUS**

Doramectina +
Levamisol HCL



✓ **LA COMODIDAD
DE DOS INGREDIENTES
EN UN SOLO PRODUCTO**



Bovinos

Contenido Neto:

250 ml
500 ml

USO VETERINARIO

ANTIPARASITARIO DE AMPLIO ESPECTRO **Endecto PLUS** Doramectina + Levamisol HCL

www.laboratorioscherryvenezuela.com

Endecto **PLUS**

Doramectina +
Levamisol HCL



DORAMECTINA Y LEVAMISOL **UNA DUPLA PODEROSA**

• USO VETERINARIO •

Endecto **PLUS**

Es un Endectocida de Amplio Espectro de prescripción, con la comodidad de una sola inyección que contiene dos ingredientes activos.

La combinación de dos principios activos con diferente mecanismo de acción, como lo son:

- **LA DORAMECTINA** (una lactona macrocíclica) esta se une a receptores que aumentan la permeabilidad de la membrana a los iones cloruro lo que lleva a parálisis muscular y muerte del parásito.
- **EL LEVAMISOL** (un imidazotiazol) ejerce su acción sobre el sistema neuromuscular del parásito, actuando como un agonista de los receptores nicotínicos de la acetilcolina, lo que provoca una contracción muscular sostenida, seguida de relajación y parálisis irreversible del parásito.

Esta combinación proporciona una Eficacia de Amplio Espectro para un Control Superior de los Parásitos Internos y Externos

- ✓ **ES UNA HERRAMIENTA PODEROSA PARA EL CONTROL INTEGRADO DE NEMATODOS, ESPECIALMENTE VALIOSA PARA MEJORAR LA SALUD ANIMAL EN GANADERÍAS.**



Contenido Neto:

250 ml
500 ml

USO VETERINARIO

ANTIPARASITARIO DE AMPLIO ESPECTRO **Endecto PLUS** Doramectina + Levamisol HCL

Endecto **PLUS**

Doramectina +
Levamisol HCL



MANO DURA CON LOS GUSANOS RESISTENTES

• USO VETERINARIO •

COMPOSICIÓN:

Cada 100 ml contiene:

Doramectina	0,5 g
Levamisol HCl	15,0 g
Excipientes c.s.p.	100,0 ml

INDICACIONES DE USO:

Endecto **PLUS**

La combinación de Doramectina y Levamisol es bien tolerada por hembras reproductoras y terneros jóvenes, incluso en concentraciones tres veces mayores en becerros de tan solo 3 meses de edad.



UNIÓN Y AMPLIO ESPECTRO

La combinación ataca a los parásitos desde diferentes ángulos, mejorando la eficacia contra diversas especies de nematodos.

PROPIEDADES:

Nemátodos gastrointestinales

(adultos y larvas en cuarto estadio).

Haemonchus sp.

Trichostrongylus sp.

Cooperia sp.*

Bunostomum phlebotomum *

Strongyloides papillosus *

Oesophagostomum sp.

Trichuris spp *

*** Actúa solo estado adulto**

Nemátodos pulmonares

(adultos y larvas de cuarto estadio).

Dictyocaulus viviparus.

Ácaros productores de sarna:

Psoroptes spp. *Sarcoptes* spp.

Piojos chupadores:

Haematopinus spp.

Linognathus spp.

Solenopotes spp.

Larvas cutáneas Responsables de miasis e infestaciones.

Cochliomyia hominivorax. *Dermatobia hominis*.

Se ha demostrado que en los animales jóvenes (6 meses a 1 año) tratados con ENDECTO Plus hay una mayor conversión de carne.

ANTIPARASITARIO DE AMPLIO ESPECTRO **Endecto PLUS** Doramectina + Levamisol HCL

Endecto **PLUS**

Doramectina +
Levamisol HCL



REDUCCIÓN DEL RECuento DE HUEVOS EN HECES

• USO VETERINARIO •

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS:

Vía inyectable subcutánea en la tabla del cuello como dosis única, 1 ml por cada 25 kg de peso vivo, equivalente a 0,2 mg de Doramectina / kg y 6 mg de Levamisol / kg.

NOTA: No aplicar más de 10 ml en un mismo punto de inyección.

PESO VIVO (kg)	DOSIS (ml)
----------------	------------

PESO VIVO (kg)	DOSIS (ml)
50	2
100	4
150	6
200	8
250	10
300	12
400	16
500	20
550	22

PÉRDIDAS ECONÓMICAS

Las parasitosis internas producen pérdidas económicas enormes en las unidades de producción pecuarias.

Estas parasitosis dan como resultados una diversidad de problemas tales como:

- Menor ganancia de peso diaria y en casos extremos puede producirse la muerte de los animales.
- Menor ingestión de alimento.
- Menor conversión alimenticia.
- Deficiente en el funcionamiento del sistema inmune (animales inmunosuprimidos, con poca capacidad de dar una buena respuesta vacunal).
- Menor producción de leche.
- Menor eficiencia reproductiva aumentando los días abiertos.

✓ MEJORA DE LA PRODUCCIÓN

Al reducir significativamente la carga parasitaria, se observa una mejor ganancia de peso y salud general en bovinos.

ANTIPARASITARIO DE AMPLIO ESPECTRO **Endecto PLUS** Doramectina + Levamisol HCL

Endecto **PLUS**

Doramectina +
Levamisol HCL



MANEJO EFICAZ DE LOS PARÁSITOS

• USO VETERINARIO •

REACCIONES ADVERSAS:

- Puede producirse una leve inflamación transitoria en el sitio de aplicación. Consulte al Médico Veterinario.
- No usar en conjunto con productos que contengan inhibidores de la colinesterasa.
- No administrar vía intravenosa, en tal caso puede observarse hipersalivación, la cual desaparecerá en pocas horas. Si esta persiste, consulte al Médico Veterinario.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

- Evitar el contacto con ojos y piel.
- En caso de contacto ocular accidental, enjuagar con abundante agua durante al menos 15 minutos.
- No fumar ni ingerir alimentos durante la manipulación.
- Lavar manos tras la aplicación.
- En caso de autoinyección accidental, acudir al médico y presentar este prospecto.



CONTROL DE LARVAS Y ADULTOS

La **Doramectina** es muy efectiva contra larvas encapsuladas y adultas, mientras que el **Levamisol** es un buen controlador de adultos, cubriendo más fases del ciclo del parásito.



Bovinos

Contenido Neto:

250 ml
500 ml

USO VETERINARIO

ANTIPARASITARIO DE AMPLIO ESPECTRO **Endecto PLUS** Doramectina + Levamisol HCL

Endecto

PLUS

Doramectina +
Levamisol HCL



✓ **UNA SOLA INYECCIÓN,
CON DOS PRINCIPIOS ACTIVOS**

• USO VETERINARIO •

TIEMPO DE ESPERA:

- El ganado no debe ser sacrificado para consumo humano dentro de los 27 días siguientes al último tratamiento con este medicamento.
- No debe utilizarse en bovinos lecheros hembras 20 meses de edad o más, incluidas las vacas lecheras secas; el uso en este ganado puede causar residuos de medicamentos en la leche y/o en los terneros nacidos de estas vacas o novillas.
- No debe usarse en terneros de carne menores de 2 meses de edad, terneros lecheros y terneros de engorde.
- No se ha establecido un período de espera para este producto en terneros pre - rumiantes.

ALMACENAMIENTO, MANIPULACIÓN Y ELIMINACIÓN:

- Almacenar por debajo de 25 °C (77 °F).
- No exponga a la luz durante largos períodos de tiempo.
- No contamine el agua por una aplicación extrema o por la eliminación inadecuada de los envases de medicamentos.
- Deseche los recipientes en un vertedero aprobado o incinerándolos.

✓ **ACCIÓN INMUNOMODULADORA**

El **Levamisol** tiene efectos inmunoestimulantes, ayudando a restaurar la función inmune deprimida por la parasitosis, lo que complementa la acción antiparasitaria.

ANTIPARASITARIO DE AMPLIO ESPECTRO **Endecto PLUS** Doramectina + Levamisol HCL

Endecto **PLUS**

Doramectina +
Levamisol HCL



✓ **MENOS LESIONES Y
ESTRÉS PARA EL ANIMAL**

LA DORAMECTINA es el mejor endectocida para el tratamiento y control de parásitos internos y externos y combinado con **LEVAMISOL** demuestra la eficacia de este novedoso producto, con un espectro de actividad más amplio que el de cada fármaco por separado.

Su **Doble Acción** proporciona una solución única y práctica para el tratamiento y control de nematodos gastrointestinales y funciona contra la resistencia de parásitos internos.

Con
**Endecto
PLUS**

se logra una **reducción del recuento de huevos en heces** para un manejo eficaz de los parásitos activos.

ADVERTENCIAS DE RESIDUOS:

- No acto para uso humano. Mantener fuera del alcance de los niños.
- Si se produce contacto accidental con los ojos, lávelos inmediatamente con agua durante 15 minutos y busque atención médica.
- Si usa lentes de contacto, enjuague los ojos inmediatamente con agua antes de quitarse los lentes y luego continúe enjuagando durante al menos 15 minutos.
- No coma, beba ni fume mientras manipula el producto. Lávese las manos después de su uso.
- El uso de Levamisol en bovinos tratados en los últimos días con inhibidores de la colinesterasa como organofosforados o con morantel puede aumentar los efectos tóxicos del Levamisol. Úselo junto con precaución.
- No se ha evaluado la seguridad reproductiva en toros destinados a la reproducción.
- Al igual que con otras Avermectinas, la Doramectina se excreta en el estiércol de los animales tratados y puede inhibir la reproducción y el crecimiento de plagas e insectos beneficiosos que utilizan el estiércol como fuente de alimento y para la reproducción.
- La magnitud y la duración de tales efectos son específicas de la especie y del ciclo de vida.
- Cuando se usa de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta, no se espera que el producto tenga un impacto adverso en las poblaciones de insectos dependientes del estiércol.
- No debe aplicarse simultáneamente cuando los animales sean bañados con **Amitraz Calbos®**.



PRESENTACIONES:

250 ml y 500 ml

ANTIPARASITARIO DE AMPLIO ESPECTRO **Endecto PLUS** Doramectina + Levamisol HCL

Endecto *PLUS*

Doramectina +
Levamisol HCL

• USO VETERINARIO •



Bovinos



SÍGUENOS:  @labcherryvzla www.laboratorioscherryvenezuela.com

Producto para Grandes Animales del

GRUPO
Suply Vet

