



CATÁLOGO

El mejor aliado para la salud y
protección de sus animales.

Farmagro c.a., nace el 16 de julio de 1996 en Maracay, estado Aragua, con un reducido y excelente equipo de trabajo.

Hoy en día hemos avanzado en cantidad, calidad y experiencia al servicio de la actividad pecuaria, con la producción de fármacos destinados a combatir las diferentes patologías de los animales domésticos y con los máximos estándares de calidad en función de satisfacer las necesidades de la producción agropecuaria nacional.

Misión

Ser el laboratorio de referencia nacional e internacional de producción de fármacos de alta calidad para diferentes renglones vinculados al campo agropecuario.

Visión

Liderar el mercado agrícola venezolano e internacional con fármacos de altos estándares de calidad, innovadores, eficaces y amigables con el medio ambiente en concordancia con la

Objetivos

Producir fármacos y continuar aplicando e innovando los controles de calidad tanto en materia prima como en nuestros productos finales.

Alcanzar que nuestros productos sean la solución más viable para lograr la optimización de la salud del sector agropecuario. Les ofrecemos nuestros productos elaborados pensando en el bienestar y el mayor rendimiento productivo de sus animales así como en la solución de la problemática que se les puede presentar.

Shampoo

SHAMPOO

Medicado dermatitis seborreica

Composición

Composición Alquil diglicol étersulfato de sodio.....20g
Peróxido de benzoilo.....2,5 g
Agua desmineralizada c.s.p.....100 ml

Indicaciones

En perros para el tratamiento de la pioderma, seborrea oleosa, acné canino y como tratamiento previo al baño antiparasitario en pacientes con sarna demodética.

Presentación: Líquido en envases de polipropileno de alta densidad de 240ml.



SHAMPOO

Medicado contra Ectoparásitos

Composición

Composición Alquil diglicol étersulfato de sodio.....20g
Amitraz.....0,2g
Agua desmineralizada c.s.p.....100 ml

Indicaciones

En perros controla activamente pulgas, garrapatas y ácaros de la sarna los cuales mueren de inmediato, además de poseer un excelente poder de limpieza dando brillo natural al pelaje. **Uso exclusivo en caninos.**

Presentación: Líquido en envases de polipropileno de alta densidad de 240ml.



Uso externo. Aplicar el producto en el dorso del animal y frotar hasta hacer abundante espuma. Retirar el producto con abundante agua. Venta bajo prescripción del médico veterinario.

SHAMPOO

Embellecedor para perros y gatos

Composición

Composición Alquil diglicol éter
sulfato de sodio 2,5g
Agua desmineralizada c.s.p 100 ml

Indicaciones

Para el baño rutinario de perros y gatos. Limpia profundamente dando brillo natural al pelaje y dejándolo perfumado.

Presentación: Líquido en envases de polipropileno de alta densidad de 240ml.



SHAMPOO

Embellecedor con repelente

Composición

Composición Alquil diglicol éter
sulfato de sodio 20g
Aceite de citronela 3 ml
Agua desmineralizada c.s.p 100 ml

Indicaciones

Repelente de mosquitos y otros insectos externos para el baño rutinario de perros y gatos. Limpia profundamente dando brillo natural al pelaje y dejándolo perfumado.

Presentación: Líquido en envases de polipropileno de alta densidad de 240ml.



SANAFARM

Crema cicatrizante

Presentación:

Envases de 60 y 250 gramos.



Composición

Sulfato de colistina.....	0,6 g
Sulfametazina sódica.....	7,5 g
Diclofenaco sódico.....	10 G
Vitamina A.....	8.000 UI
Óxido de zinc.....	10 g
Glicerina.....	7 g
Excipientes c.s.p.....	100g

Indicaciones

Es una pomada antiinflamatoria, cicatrizante, antiséptica, suavizante, descongestiva y analgésica para el tratamiento de lesiones en ubre, pezones, quemaduras y abrasiones, heridas infectadas e inflamaciones por picaduras de insectos y como coadyuvante en la mastitis.

Composición

Diazinon.....	2,5 %
Alfa cipermetrina.....	0,15%
Citronella.....	2%
Aceite de pino.....	2%

Indicaciones

Aplique una vez al día, con paleta o espátula en las zonas afectadas por gusaneras, nuches o sarnas; sobre las heridas y ulceraciones de la piel, después de castrar, descornar, marcar y sobre el ombligo de los recién nacidos, en el control del gusano de la nariz de las ovejas aplicar alrededor de las fosas nasales.

LARVAFARM

Larvicida-cicatrizante
-repelente

Presentación:

Envases de 60 y 250 gramos.



Baños Podales

PODOFARM

Desinfectante cicatrizante



Composición

Amonio cuaternario.....60 ml
Alcohol isopropílico.....100ml
Formaldehído 40%.....100ml
Aceite mineral.....1 ml
Sulfato de zinc.....40 g
Sulfato de cobre40 g
Tintura de yodo.....10 ml
Excipiente c.s.p.....1000 ml

Indicaciones

Es un producto para ser aplicado mediante baños podales (solución al 20% en agua) haciendo pasar a los animales a través de un baño de pies y dejar que descansen seguidamente en suelo limpio y seco, por lo menos durante una hora.

Administración y dosis

Aplicar mediante baños podales (solución al 20% en agua) haciendo pasar a los animales por un pediluvio y dejar que descansen seguidamente en suelo limpio y seco, por lo menos durante una hora.

Presentación: Líquido en envase de polipropileno de alta densidad de 250 ml, 1 L, Galón y 20 litros.

Desinfectante

MULTIFARM CLEANER

Indicaciones

Desinfectante Líquido de amplio espectro formulado para la desinfección eficaz de superficies, utensilios, instalaciones, equipos, pediluvios, rodaluvios y vehículos en granjas avícolas, porcinas, bovinas, clínicas veterinarias, laboratorios, quirófanos y áreas de procesamiento de alimentos.

Administración y dosis

Aplicar por aspersión, inmersión o lavado directo. Dejar actuar 10-15 minutos. No enjuagar, excepto en superficies en contacto con alimentos o agua de bebida. Dilución: Superficies y Equipos: 1:100 (10 ml/litro de agua). Cuarentena y brotes: 1:50 (20 ml/litro de agua).

Presentación: Líquido en envase de polipropileno de alta densidad de 1 L, Galón, y 20 litros.

Composición

Amonio cuaternario.....60 ml
Glutaraldehído.....20 ml
Peróxido de hidrógeno.....30 ml
Ácido peracético.....5 ml
Excipientes c.s.p.....1000 ml



Desinfectante

BIOFARM Desinfectante

Dosis y modo de uso

Aspersión: (desinfección terminal de rutina) Dilución 1 en 200 L de agua para tratar 800 m².

Inmersión: (Pediluvios y Arcos Sanitarios). Llenar los pediluvios y arcos sanitarios con una solución de Biofarm desinfectante al 1%.

Nebulización: 200 a 300 mL por cada 18 L de agua por 1000 cm³. Vaporizar un fino velo de desinfectante sobre los animales puede reducir la infección cruzada durante los brotes de enfermedades respiratorias u otras. Aplique una llovizna muy fina 2 a 4 veces al día sobre animales. Aplicación directa sobre pisos y paredes.

Composición

Amonio Cuaternario de 5ta Generación.....5g
Extracto de citronella2ml
Aceite de Pino2ml
Excipientes c.s.p100ml

Indicaciones

Es una mezcla sinérgica de ingredientes de comprobada eficacia y de mucha utilidad en instalaciones pecuarias (aves en general, porcinos, bovinos, equinos, caprinos, ovinos, conejos, caninos y felinos), incubadoras, salas de ordeño, mataderos industriales, granjas, pediluvios, clínicas, hospitales y quirófanos.

Presentación: Líquido en envase de polipropileno de alta densidad de 350 ml, 1 L, Galón. y 20 litros.



EUCALIPFARM

Composición

Amonio Cuaternario 5ta Generación.....3g
Mentol1 mg
Eucalipto.....1 mg
Excipientes c.s.p.....100 ml

Indicaciones

Es un desinfectante de amplio espectro de acción con una combinación de ingredientes de comprobada eficacia en instalaciones con materia orgánica y aguas duras, actuando sobre gérmenes patógenos tales como bacterias, virus, levaduras y hongos.

Dosis y modo de uso

Oral: Usar 500ml por cada 1000 litros de agua de bebida por un período de 3 a 5 días. Aspersión: Diluir 300 ml del producto en envases de 20 L de agua y asperjar en horas frescas.

Presentación: Líquido en envase de polipropileno de alta densidad de 240 ml, 1 L, Galón. y 20 litros.



Desinfectante

IODOFARM

Solución desinfectante – bactericida –
fungicida – viricida

Composición

Iodo Povidona 7 g
Agua Desmineralizada c.s.p.....100 ml

Indicaciones

Es una solución antiséptica desinfectante de acción profunda contra agentes bacterianos, virales, micóticos, protozoos y levaduras.

Dosis y modo de uso

En desinfección de equipos de granjas e incubadoras: 1 L por cada 300 L de agua. En aspersión: 0,5 – 1 L por cada 2000 L de agua. Uso tópico a juicio del Médico Veterinario.

Presentación: Líquido en enbase de polipropileno de alta densidad de 250cc, 1 L y Galón.



Detergente

BIOFARM

Detergente surfactante

Indicaciones

Está recomendado para el lavado de instalaciones pecuarias tales como galpones avícolas, corrales, establos, caballerizas, granjas, porquerizas, incubadoras, salas de ordeño, mataderos industriales, salas de matanza, granjas, pediluvios, ya sean muy contaminadas o con menor grado de contaminación. Igualmente se recomienda en vagones de transporte, camiones, cavas, y demás superficies similares.

Composición

Etilendiaminatetraacetato de sodio (EDTA).....3 g
Citrato de Sodio.....3,5g
Nonil Fenol Etoxilado.....15g
Excipientes c.s.p.....100ml

Dosis y modo de uso

Áreas muy contaminadas 1 L por cada 100 L de agua para el lavado de 500 m² de superficie. Áreas menos contaminadas 1L por cada 200 L de agua para el lavado de 500 m² de superficie.

Presentación: Líquido en envase de polipropileno de alta densidad de 1 L, Galón. y 20 litros.



Antimicótico



MICOFARM A.M. Solución antimicótica

Composición

Sulfato de cobre	25 g
Azul de metileno	25 g
Vitamina K3	1g

Dosis y modo de uso

Por vía oral usar 1 litro por cada 1000 litros de agua de bebida, durante 5 días. En casos severos usar 2 L por cada 1000L de agua durante 5 días. Para tratar lesiones podales (casquera, chinela, hormiguillo) aplicar en forma tópica la cantidad necesaria. A juicio del Médico Veterinario

Indicaciones

Producto de **uso externo** como antiséptico y antimicótico de gran utilidad para el tratamiento de las micosis digestivas en aves causadas por *Aspergillus* sp., *Cándida albicans* y otros, solo debe utilizarse a muy bajas concentraciones y bajo estricta indicación del Médico Veterinario. El micofarm A.M también puede utilizarse en tratamiento tópico de lesiones podales de bovinos, ovinos, caprinos, caninos, equinos y cerdos. **Se usa en el corte del pico en aves.**

Presentación: Líquido en envase de polipropileno de alta densidad de 250 cc, 1 L y Galón

Rodenticida

FULMI-RAT Anticoagulante Rodenticida

Composición

Brodifacoum	0,005 g
Aditivos	99,995 g

Dosis y modo de uso

10 gramos por puesto de cebo. Los comederos deben ser revisados, si es necesario, cada tres días, reubicándolos y reponiendo el producto, hasta que no haya consumo, lo cual indica que, para ese momento, los niveles de roedores como plaga, se consideran no perjudiciales.

Indicaciones

Es eficaz por ingestión simple, por lo tanto, hay que colocar los cebos cerca de las madrigueras y los caminos de paso de los roedores, preferiblemente colocando los comederos cada 5 metros, en el perímetro del área que quiere proteger. Los comederos deben ser revisados, si es necesario, cada TRES días, reubicándolos y reponiendo el producto, hasta que no haya consumo.

Presentación: Envase de 150gr y tobos de 10 kg.



Bachaquicida

FULMI-ANT

CEBO FORMICIDA
Control de bachacos y hormigas



Composición

FIPRONIL.....	0,5
Fibras vegetales atrayentes.....	99,5
TOTAL.....	100,0

Dosis y modo de uso

5 g por cada nido ó 100 g/100 m2 de superficie dependiendo de la población de hormigas o bachacos. No debe aplicarse cuando se esperan lluvias porque la humedad excesiva puede descomponer el pellet.

Indicaciones

Se indica su uso en diversos cultivos como Hortalizas, legumbres, frutales, maderables, incluyendo casas y jardines.

Especies

Hormigas y Bachacos.

Presentación: Envase de 500gr.

Vitaminas

MULTIVIT

Polvo soluble
reconstituyente

Composición

Vitamina A.....	1.500.000 UI
Vitamina D3.....	1.500.000 UI
Vitamina E.....	10.000 UI
Vitamina K.....	2.550 mg
Vitamina B1.....	1.830 mg
Vitamina B2.....	3.333 mg
Vitamina B6.....	3.333 mg
Vitamina B12.....	10.000 mg
Acido Fólico.....	667 mg
Vitamina C.....	11.2 mg
Biotina.....	83 mg
Acido Nicotínico.....	16.000 mg
D-Pantotenato de Calcio.....	10.000 mg
Excipientes c.s.p.....	500 g

Indicaciones

Es un complemento vitamínico indicado para aves, cerdos, bovinos, ovinos, caprinos, equinos, conejos, caninos y felinos, que apoya en enfermedades infecciosas, parasitarias, desbalances nutricionales por estrés y mejora el estado general tras avitaminosis, micotoxicosis o presencia de taninos y grasas alteradas en la alimentación.

Especies

Aves, Equinos, Bovinos, Búfalo, Ovinos, Caprinos, Porcinos y Caninos.

Administración y dosis

Utilizar en el agua de bebida 250 g/1000 litros de agua por 3 días. En casos severos 250 g en 500 litros de agua; durante 3 a 5 días continuos. En el alimento 1 g por cada kg de concentrado durante 5 días continuos.

Presentación: Polvo soluble en envases de 125 g y 250g.



Protector

VACCFARM

Protector y marcador de vacunas



Composición

Suero de leche.....14g
Cloruro de Sodio.....3g
Colorante Vegetal.....0,5g
Excipientes c.s.p.....100mg

Indicaciones

Inactivador del cloro en el agua de bebida, ajuste de pH y como marcador en la vacunación de aves.

Administración y dosis

Por vía oral diluir 200g por cada 100 L de agua de bebida a utilizar en la vacunación. A criterio del Médico Veterinario.

Especies

Aves

Presentación: Polvo soluble. Bolsa de 200 g

Promotor del crecimiento

FORTE-FARM

Promotor de crecimiento

Composición

Acido Fumárico..... 40g
Acido Cítrico..... 10g
Excipientes c.s.p..... 100g

Administración y dosis

En el alimento concentrado mezclar 1 kg de Forte-Farm por cada 1.000 kg de alimento o en el agua de bebida 1 kg de Forte-Farm por cada 1.000 L de agua desde la recepción hasta el día 42. A criterio del médico veterinario.

Indicaciones

Es una mezcla de ácido fumárico y ácido cítrico que mejora la ganancia de peso por sus efectos acidificantes intestinales, bactericidas y bacteriostáticos. Mejora la salud y absorción intestinal, tiene acción antifúngica y aporta energía metabolizable. Su acción principal incluye actividad antimicrobiana, estimulación pancreática y efecto trófico.

Especies

Aves y cerdos.

Presentación: Polvo soluble. Bolsa de 500 g y 1.000 g.



Vitaminas

OXYVITFARM

Polvo soluble antibiótico, antitóxico y vitaminas



Composición

Oxitetraciclina.....	50 g
Vitamina A.....	2.000.000
Vitamina D3.....	600.000 UI
Vitamina E.....	9.000 UI
Vitamina K.....	200 mg
Vitamina B1.....	2.500 mg
Vitamina B2.....	2.500 mg
Vitamina B6.....	2.500 mg
Vitamina B12.....	10.000 mg
Acido Fólico.....	600 mg
Biotina.....	45,5 mg
Acido Pantoténico.....	2,2 mg
Niacina.....	5,5 mg
Metionina.....	150 g
Lisina.....	112 g
Excipientes c.s.p.....	1.000 g

Indicaciones

Es una combinación de vitaminas, antibióticos y aminoácidos con efecto hepatoprotector, indicada para aves, porcinos, conejos, bovinos, ovinos, caprinos y equinos. Se usa en la recepción de aves y como coadyuvante en enfermedades bacterianas o virales con lesiones hepáticas, mejorando la reproducción, estimulando la postura y contrarrestando efectos de micotoxinas y estrés ambiental.

Especies

Aves en general, cerdos, bovinos, ovinos, caprinos y conejos.

Administración y dosis

1 kg por cada 1.000 litros de agua, por 3 a 7 días continuos. En casos severos 1 kg en 500 litros de agua por períodos de 5 días continuos.

Presentación: Polvo soluble en envases de 125 g, 500g y 1000 g.

LIPOVIT

polvo soluble antitóxico y protector hepático

Composición

Vitamina A.....	2.000.000 UI
Vitamina D3.....	600.000 UI
Vitamina E.....	9.000 UI
Vitamina K.....	200 mg
Vitamina B1.....	2.500 mg
Vitamina B2.....	2.500 mg
Vitamina B6.....	2.500 mg
Vitamina B12.....	2.500 mg
Acido Fólico.....	600 mg
Biotina.....	45,5 mg
Ácido Pantoténico.....	2,2 mg
Niacina.....	5,5 mg
Metionina.....	150 g
Lisina.....	112 g
Excipientes c.s.p.....	500 g

Indicaciones

Es una combinación de vitaminas y aminoácidos con efecto protector y antitóxico hepático, indicada para aves, porcinos, conejos, bovinos, ovinos, caprinos, equinos, caninos y felinos. Se usa como coadyuvante en enfermedades bacterianas o virales, mejora la reproducción y contrarresta efectos de micotoxinas y estrés ambiental.

Especies

Aves en general, cerdos, bovinos, ovinos, caprinos, equinos, conejos, caninos y felinos.

Administración y dosis

En el agua de bebida o en el alimento concentrado. Aves: 500 g por cada 1.000 litros de agua durante 5 a 7 días continuos. Cerdos y otras especies: 500 g por cada 1.000 litros de agua o 500 g por cada 1.000 kg de alimento durante 5 a 7 días continuos.

Presentación: Polvo soluble en envases de 125 g y 500 g.



OXYTILFARM

Polvo soluble reconstituyente

Administración y dosis

En el agua de bebida o alimento concentrado.

Aves: Recepción de pollitos y preventivo en aves adultas 1g por L de agua durante 5 días continuos.

Dosis curativa: 1,5g por L de agua de bebida durante 2 días continuos y seguir con 1g por L de agua por 3 días más.

Cerdos, becerros y ovinos: 3 a 5g por cada L de agua de bebida o 3 a 5g por cada kg de concentrado, durante 5 días seguidos.

Conejos: 1,5 g por L de agua de bebida o 3 g por kg de alimento, durante 5 días continuos.

A juicio del médico veterinarios.

Indicaciones

Indicado para aves en colibacilosis, salmonelosis, coriza y problemas respiratorios. En cerdos y becerros, para infecciones de piel, tracto digestivo y respiratorio.

Composición

Oxitetraciclina HCL.....200g
Tylosina Tartrato100g
Ciprofloxacina150g
Excipientes c.s.p.1.000g

Especies

Aves en general, cerdos, bovinos, ovino y conejos.

Presentación: Polvo soluble en sobres de 125 g, 500 g y 1000 g.



FURTIL

Polvo antibiótico soluble

Composición

Ciprofloxacina.....150g
Tylosina Tartrato.....60g
Excipientes c.s.p.....1.000g

Especies

Aves en general, conejos, cerdos, ovinos y en becerros hasta los 3 meses de edad.

Indicaciones

Previene y trata enfermedades en aves como micoplasmosis, coriza infecciosa, colibacilosis, salmonelosis, cólera y sinovitis, controlando infecciones secundarias de viruela aviar o buba. En cerdos, es eficaz contra pleuritis, enteritis, onfalitis, septicemia hemorrágica, metritis y enfermedad respiratoria crónica por *Mycoplasma* sp y leptospirosis en pie de cría. En bovinos contra diarreas, fiebre de embarque y neumonías.

Administración y dosis

En agua de bebida: Preventivo, Aves 1 g por cada litro durante 5 días. Curativa: 2-3 g/litro de agua durante 3-5 días. Ovinos, Cerdos y Becerros (hasta los 3 meses): 1-3 g/litro de agua o por kg de alimento durante 5-7 días.

Presentación: Polvo soluble. Bolsas de 125 g y 1.000 g.



Antibióticos



NEOBROXIL

Polvo antibiótico soluble

Composición

Neomicina Sulfato177g
Oxitetraciclina HCL.....177g
Bromexina HCL5g
Excipientes c.s.p.....1000g

Indicaciones

Neobroxil es una combinación sinérgica de dos antibióticos, oxitetraciclina y neomicina, eficaz en prevención y tratamiento de enfermedades por gérmenes gramnegativos como salmonelosis, colibacilosis, cresta azul, enteritis bacteriana y enfermedad respiratoria crónica. y por acción de la bromhexina, mucolítico expectorante, disminuye la viscosidad y provoca la fluidificación de las secreciones del epitelio respiratorio.

Administración y dosis

Preventivo: En el agua de bebida Utilizar 1 a 2g por cada 1 L de agua durante 7 días continuos.
Curativo: 3 g por L de agua durante 5 a 7 días.
A juicio del médico veterinario.

Presentación: Polvo soluble.
Sobres de 125 g, 500 g y 1.000 g

Especies

Aves en general, cerdos, conejos, bovinos y ovinos.

COLSUFARM

Polvo antibiótico soluble

Composición

Sulfato de Colistina500.000.000 UI
Tylosina Tartrato4.5g
Sulfametacina Sódica.....90g
Trimetropim Glutamato.....25g
Bromexina HCL.....5g
Excipientes c.s.p.....1000g

Indicaciones

Es una asociación sinérgica de antibióticos eficaz para prevenir y tratar enfermedades por gérmenes Gram positivos y negativos, incluyendo complicaciones respiratorias, ERC, micoplasmosis, colibacilosis, coriza y enteritis.

Administración y dosis

Preventivo: 1 a 3g por cada 1 litro de agua o por kg de alimento durante 5 a 7 días.
Curativo: 3 a 5g por cada 500 L de agua por 5 días.
Conejos: 0.5g por cada 1 litro de agua, por 5 días. A juicio del Médico Veterinario.

Especies

Aves, cerdos, bovinos y ovinos.

Presentación: Polvo soluble.
Sobres de 125 g, 500 g y 1000g.



Antibióticos

FARMATRIN

Polvo antibiótico soluble

Composición

Tylosina Tartrato	45g
Sulfametazina sódica	125g
Trimetopim Glutamato	25g
Excipientes c.s.p	1000g

Administración y dosis

Preventivo: 1 a 3 g por cada 1 litro de agua o por kg de alimento durante 5 a 7 días.
Curativo: 3 a 5g por cada 500 L de agua por 5 días.
Conejos: 0.5g por cada 1 litro de agua, por 5 días.
A juicio del Médico Veterinario.

Indicaciones

FARMATRIN es una asociación de antimicrobianos eficaz para prevenir y tratar enfermedades digestivas y respiratorias en aves, porcinos, conejos y bovinos, incluyendo enfermedad crónica respiratoria, diarreas y otras infecciones causadas por gérmenes patógenos como E. coli.

Especies

Aves de engorde cerdos, bovinos y conejos.

Presentación: Polvo soluble.
Sobres de 125 g, 500 g y 1000g.



FURACORTIL

Polvo antibiótico soluble

Composición

Neomicina Sulfato.....	150g
Tylosina Tartrato.....	60g
Ciprofloxacina	150g
Excipientes c.s.p.....	1.000g

Administración y dosis

Dosis preventiva 1g por L durante 2 días. Dosis curativa 2g por L durante 3 días. la dosis curativa debe ser durante un período de 5 días.

Presentación: Polvo soluble.
Sobres de 125 g, 500 g y 1000g.

Indicaciones

Asociación de Tylosina, Neomicina y Ciprofloxacina, antibióticos que actúan contra bacterias Gram-positivas y Gram- negativas para el tratamiento de infecciones generales y locales por gérmenes sensibles, tales como trastornos gastroentéricos, enfermedades respiratorias bacterianas, neumónicas, entéricas, disentería, rinitis atrófica, neumonía enzoótica y otras

Especies

Aves en general, cerdos y en becerros hasta los 3 meses de edad.



Antibióticos

CIPROFARM

Polvo antibiótico soluble

Composición

Ciprofloxacina 150g
Excipientes c.s.p 1000g

Administración y dosis

Dosis preventiva: En el agua de bebida 1 a 2g por L durante 5 días continuos.

Curativa: 3g por L de agua durante 5 a 7 días.

Cerdos y Becerros: 2g por cada litro de agua de bebida o 3g por Kilogramo de alimento, por 5 días.

A juicio del Médico Veterinario.

Indicaciones

Quinolona de amplio espectro que actúa contra Micoplasmas, sp., gérmenes Gram + y Gram - sensibles.

Enfermedades específicas en aves, cerdos, conejos y bovinos.

Especies

Aves, cerdos, bovinos y conejos.

Presentación: Polvo soluble.
Sobres de 125 g, 500 g y 1000g.



COLISTYFARM

Polvo antibiótico soluble

Composición

Sulfato de Colistina 300.000.000 UI
Tylosina Tartrato 150g
Excipientes c.s.p 1.000g

Administración y dosis

Aves: 1g por cada litro de agua durante 7 días. Cerdos y Conejos: 3 a 5g por cada litro de agua o por cada kilogramo de alimento durante 5 días. A criterio del médico veterinario.

Indicaciones

Es una combinación de dos antimicrobianos: tylosina tartrato, un macrólido contra gérmenes Gram positivos y Micoplasma sp., y sulfato de colistina, un antibiótico polipeptídico activo contra bacterias Gram positivas y negativas, indicado para aves, conejos y cerdos.

Especies

Aves en general, cerdos y conejos

Presentación: Polvo soluble. Sobres de 125 g, 500 g y 1.000 g.



Hidratante

HIDRAFARM

Hidratante con electrolitos

Composición

Cloruro de Sodio.....	85 g
Lactato de Calcio.....	30 g
Bicarbonato de Sodio.....	140 g
Cloruro de Potasio.....	70 g
Metionina.....	10 g
Acido Cítrico.....	5 g
Acetaminofen.....	45 g
Excipientes c.s.p.....	1000 g

Indicaciones

Es un producto con mezcla balanceada de electrolitos, aminoácidos y analgésicos, indicado para tratar deshidratación por causas bacterianas, virales o nutricionales, estrés, calor, transporte, vacunación, choque, pérdidas de líquidos e intoxicaciones.

Administración y dosis

En el agua de bebida. Utilizar 1.000 g por cada 1.000 L de agua durante 5 a 7 días continuos. Puede administrarse simultáneamente con antibióticos y otros quimioterápicos A criterio del médico veterinario.

Especies

Aves en general, cerdos, bovinos, equinos, ovinos, caprinos, caninos felinos y conejos.

Presentación: Polvo soluble. Sobres de 125 g, 500 g y 1.000 g.



Antidiarreicos

PORCIFARM

Polvo Antidiarreico Soluble

Composición

Oxido de Zinc.....	20 g
Propionato de Calcio.....	400 mg
Excipientes c.s.p.....	100 g

Indicaciones

Previene la diarrea post destete en lechones y promueve el crecimiento. El zinc reduce el estrés oxidativo, protegiendo la pared intestinal, mejora la actividad de enzimas antioxidantes y mantiene la homeostasis intestinal durante este periodo crítico.

Administración y dosis

En el alimento concentrado mezclar 1 kg de Porcifar por cada 1000 kg de alimento. Suministrar (ad libitum) desde el destete hasta la segunda semana después del destete.

Especies

Cerdos.

Presentación: Polvo soluble. Sobres de 500g y 1000g.



Antibióticos



AMOXIFARM C

Polvo antibiótico soluble

Composición

Amoxicilina trihidrato.....	100 g
Sulfato de colistina.....	500.000.000 UI
Ciprofloxacina.....	100 g
Bromhexina.....	5 g
Excipientes c.s.p.....	1000 g

Indicaciones

Asociación de tres drogas antimicrobianas y un mucolítico. Se recomienda contra colibacilosis, salmonelosis, coriza y otros problemas respiratorios en aves. En cerdos y becerros para infecciones secundarias a procesos virales.

Administración y dosis

Por vía oral en el agua de bebida o en el alimento concentrado, solo en cerdos. Aves en general: 1 a 3 g por cada 1 litro de agua, por 5 días. Conejos: 0.5 g. por cada litro de agua, por 5 días. Cerdos: 3 a 5 g por kg de alimento durante 5 a 7 días
A juicio del Médico Veterinario

Especies

Aves, conejos, cerdos y becerros hasta los 3 meses de edad.

Presentación: Polvo soluble.
Bolsas de 125 g, 500 g y 1000 g.

AMOXIFARM

Polvo antibiótico soluble

Composición

Amoxicilina Trihidrato	100 g
Sulfato de Colistina.....	500.000.000 UI
Excipientes c.s.p	10000g

Administración y dosis

Por vía oral en el agua de bebida o en el alimento concentrado, solo en cerdos. Aves en general: 1 a 3 g por cada 1 litro de agua, por 5 días. Conejos: 0.5 g. por cada litro de agua, por 5 días. Cerdos: 3 a 5 g por kg de alimento durante 5 a 7 días A juicio del Médico Veterinario.

Indicaciones

Aves: colibacilosis, salmonelosis, coriza, enfermedades respiratorias crónicas, enteritis necrótica y complicaciones secundarias de enfermedades virales. Cerdos y conejos: infecciones de piel, tracto digestivo y respiratorio.

Especies

Aves, conejos, cerdos y becerros hasta los 3 meses de edad.

Presentación: Polvo soluble.
Bolsas de 125 g, 500 g y 1000 g.



