

NOMBRE COMERCIAL	COMPOSICIÓN	ESPECIES DE DESTINO	VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y POSOLOGÍA	PRES.
HORMONALES				
OXIVEEX Solución inyectable	Oxitocina10 UI Excipientes csp1 ml	Cerdas Vacas Yeguas Ovejas Cabras	Vacas y yeguas: Vía intramuscular o subcutánea: 3 a 5 ml. Vía intravenosa lenta: 1,5 a 3 ml. Cerdas y ovejas: Vía intramuscular o subcutánea: 2 a 3 ml Vía intravenosa lenta: 1 a 1,5 ml	10 ml 100 ml 500 ml
TESTOSTERONA-E Solución oleosa inyectable	Testosterona (propionato)25 mg Vitamina E acetato50 mg Excipientes csp1 ml	Bovino Equino Ovino Caprino	Vía intramuscular Bovinos y equinos: 10 ml/animal. Porcinos, ovinos y caprinos: 2 ml/animal. Administrar 2 veces por semana durante 1 a 3 semanas.	50 ml

SUSPENSIONES INTRAMAMARIAS

MASTIVEEX CON CEFALOSPORINA Suspensión intramamaria	Ceftiofur clorhidrato125 mg Dexametsona (21-fosfato sódico).....2 mg Excipientes csp10 g	Bovino	Una jeringa por cuarterón afectado cada 24 horas por un mínimo de 2 días	10 g
MASTIVEEX DRY Suspensión intramamaria	Cloxacilina (benzatina)500 mg Excipientes csp5 g	Bovino Ovino Caprino	Administrar la totalidad del contenido de la jeringa en cada cuarterón en dosis única después del último ordeño.	5 g
MASTIVEEX LACTACIÓN Suspensión intramamaria	Cloxacilina (sódica)200 mg Ampicilina (sódica)75 mg Excipientes csp10 g	Bovino Ovino Caprino	Una jeringa en cada cuarterón afectado cada 12 horas, durante 3 ordeños consecutivos.	10 g 5 g

FORMAS FARMACÉUTICAS ORALES

POLVOS PARA ADMINISTRACIÓN ORAL

AMOXICILINA 50% REVEEX Polvo oral	Amoxicilina (trihidrato)500 mg Excipientes csp1 g	Porcino Aves	Administración vía oral en el agua de bebida Pollos de engorde: 15 mg/kg p.v./día, durante 5 días Patos de engorde: 20 mg/kg p.v./día durante 3 días Pavos de engorde: 15 a 20 mg/kg p.v./día durante 5 días Porcino: 20 mg/kg p.v./día durante 4 días	200 g 1 kg 25 x 1 kg
COLISTINA REVEEX 2050000 UI/g Polvo oral	Colistina sulfato2050000 UI Excipientes csp1 g	Bovino Porcino Pollos Pavos	Administración vía oral en el agua de bebida Terminos y cerdos: 0,5 g/10 kg p.v./día, durante 3 días. Pollos y pavos: 0,06 g/kg p.v./día, durante 3 días	200 g 1 kg 25 x 1 kg
DOXICICLINA 50 Polvo oral	Doxiciclina (hiclato)500 mg Excipientes csp1 g	Bovino Porcino Aves	Administración por vía oral en el agua de bebida Aves: 30 mg/kg p.v./ día, durante 3-5 días Cerdos de engorde: 0,2 g/10 kg p.v./día, durante 5 días Terminos: 0,2 g/10 kg de p.v./día durante 5 días	200 g 1 kg 25 x 1 kg
LINCOMICINA 40 Polvo oral	Lincomicina (hidrocloruro)400 mg Excipientes csp1 g	Porcino Aves	Administración por vía oral en el agua de bebida Porcino: 12,5 – 25 mg/kg p.v./día de 5 a 10 días. Aves: 7,5- 15 mg /kg p.v./día, durante 7 días.	100 g 1 kg
TYLOSINA 500 REVEEX Polvo oral	Tilosona (tartrato)500 mg Excipientes csp1 g	Bovino Porcino Aves	Administración por vía oral en el agua de bebida Terminos: 20-40 mg producto/kg p.v. cada 12 horas durante 7-14 días Cerdos: 40 mg producto/kg p.v. durante 10 días Pollos: 150-200 mg producto/kg p.v. durante 3-5 días	100 g 250 g 500 g 1 kg

SOLUCIONES Y SUSPENSIONES PARA ADMINISTRACIÓN ORAL

ALBENDEX 10% Suspensión oral	Albendazol100 mg Excipientes csp1 ml	Bovino Ovino Caprino	Vía oral Nematodos gastrointestinales, estrórgilos pulmonares y cestodos: 7,5 ml/100 kg p.v. en dosis única Fasciolas adultas: 10 ml/100 kg p.v. en dosis única	200 ml 1 L 1 galón
AMPROLIUM 40% REVEEX Solución oral	Amprolium (clorhidrato)400 mg Excipientes csp1 ml	Aves	Administración por vía oral en el agua de bebida 0,5 ml/10 kg p.v./día durante 5-7 días	500 ml 1 L 5 L
BRONCOVEEX Solución oral	Bromhexina (clorhidrato)10 mg Excipientes csp1 ml	Bovino Porcino Equino Aves Ovino Caprino	Administración por vía oral en el agua de bebida Aves 100 ml en 1000 L de agua Cerdos: 0,2 a 0,5 ml/animal Lechones: 0,1 a 0,25 ml/animal Becerras: 0,3 a 0,7 ml/ animal Bovinos y equinos: 1 a 1,5 ml / animal Administer for 5 days.	1 L 1 galón
COCXIVET Solución oral	Toltrazurilo25 mg Excipientes csp1 ml	Aves	Administración por vía oral en el agua de bebida 1 ml/l de agua durante 2 días	100 ml 1 L 1 galón

NOMBRE COMERCIAL	COMPOSICIÓN	ESPECIES DE DESTINO	VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y POSOLOGÍA	PRES.
DICLAZURIL 2,5% Solución oral	Diclazurilo25 mg Excipientes csp1 ml	Bovino Ovino Aves Conejos	Administración por vía oral en el agua de bebida Bovino, ovino, caprino: 1 ml/25 kg p.v. en dosis única Conejos: 0,002 ml/kg p.v. en dosis única Aves: 0,3 mg /kg p.v./día durante 3 días	200 ml 1,5 L 1 galón
DOXYVEEX 200 MG/ML Solución oral	Doxiciclina (hiclato)200 mg Excipientes csp1 ml	Porcino Pollos Pavos	Administración por vía oral en el agua de bebida Pollos y pavos: 0,05-0,1 ml producto/kg p.v. durante 3-5 días Porcino: 1 ml producto/20 kg p.v. durante 5 días	1 L 1 galón 5 L
ENROCOLI Solución oral	Enrofloxacin50 mg Colistina (sulfato)500.000 UI Excipientes csp1 ml	Lechones Aves	Administración por vía oral en el agua de bebida o directo en boca Lechones: 1 ml producto/3 kg p.v. durante 2-3 días Aves: 1-2 ml/L agua (según edad) durante 3-5 días	250 ml 1 L
ENROFLOXACINA 20% REVEEX Solución oral	Enrofloxacin200 mg Excipientes csp1 ml	Aves	Administración por vía oral en el agua de bebida 0,05 ml /kg de p.v./día por día de 3 a 5 días.	250 ml 1 L 1 galón
FASIOLEX 10% Suspensión oral	Triclabendazol100 mg Excipientes csp1 ml	Bovino Ovino Caprino	Administración por vía oral directo en boca Bovino: 12 ml/100 kg p.v. en dosis única Ovino y caprino: 1 ml/10 kg p.v. en dosis única	1 L 5 L
FENIVEEX Solución oral	Florfenicol100 mg Excipientes csp1 ml	Porcino Aves	Administración por vía oral en el agua de bebida 1 ml/L agua de bebida/día de 3 a 5 días	1 L 1 galón
HIDRO-REX VITAL XXI Solución oral	Vitamina B1 clorhidrato 2,85 mg; Vitamina B2-5-fosfato sódico 3,2 mg; Vitamina B6 clorhidrato 1,8 mg; Biotina 0,05 mg; Nicotinamida 10 mg; Dexpantenol 5 mg; Vitamina A 325 UI; Vitamina D3 100 UI; Vitamina E acetato 4,5 mg; L-Carnitina clorhidrato 12,5 mg; Betaina 25 mg; L-Arginina 3,75 mg; L-Glicina 7,5 mg; L-Lisina clorhidrato 12,9 mg; DL-Metionina 5,5 mg; L-Triptófano 1,8 mg; L-Treonina 3,2 mg; Excipientes csp 1 ml	Bovino Equino Porcino Aves Ovino Caprino Conejos	Administración por vía oral en el agua de bebida 1-2 ml/L agua de bebida/día durante 5 días.	100 ml 1 L 18 L
PARACETAMOL LÍQUIDO 30% Solución oral	Paracetamol300 mg Excipientes csp1 ml	Porcino	Administración por vía oral en el agua de bebida. 1 ml/10 kg p.v. durante 5 días.	1L 5 L
SULFATRIM Solución oral	Sulfametoxipiridazina200 mg Trimetoprim40 mg Excipientes csp1 ml	Aves Bovino Ovino Caprino	Administración por vía oral en el agua de bebida Ovino, ovino, caprino: 1 ml/L agua, durante 7 días Aves: 0,4-0,8 ml/L agua, durante 3-5 días	1 L 5 L
VETIFOS Solución oral	Zinc (cloruro monohidrato) 4 mg; Cobre (cloruro dihidrato) 3 mg; Manganeso (cloruro tetrahidrato) 2 mg; Calcio (cloruro dihidrato) 23 mg; Magnesio (cloruro hexahidrato) 4,5 mg; Fósforo (fosfato monosódico) 100 mg; Ácido cítrico 204 mg; Excipientes c.s.p. 1 ml	Aves Porcino Bovino Ovino Caprino	Administración oral en el agua de bebida Bovino, Ovino, Caprino y Porcino: 10 a 15 ml/100 kg p.v./ día, durante 5 a 10 días Aves: 5 a 10 ml en 1 L de agua, durante 5 a 10 días.	1 L 5 L

COMPRESIDOS INTRAUTERINOS

VEEX-CICLIN 1000 MG Comprimido intrauterino	Clortetraciclina hidrocloruro1000 mg Excipientes csp8 g	Bovinos	2 comprimidos por vaca y día, en dosis única	40 x 8 g
---	--	---------	--	----------

BIOCIDAS

CIPERZURON Concentrado autoemulsionable	Cipermetrina75 mg Diflubenzurón45 mg Excipientes csp1 ml	--	Insectos voladores: 5 ml en 1 L de agua (0,5%). Desinsectación habitual: 10 ml en 1 L de agua (1%). Infestaciones fuertes: 20 ml en 1 L de agua (2%).	1 L 5 L
CLORHEX-VEEX ESPUMANTE Solución	Clorhexidina (digluconato)20 mg Excipientes csp1 ml	Porcino	Aplicación directa sobre la piel de los animales diluido al 5-10% en agua en función de la suciedad y heridas.	5 L 25 L
FENOLVEEX POULTRY Concentrado autoemulsionable	p-cloro-m-cresol250 mg Ácido salicílico100 mg Excipientes csp1 ml	--	En caso de desinfección rutinaria aplicar una dilución de 2 L / 100 L de agua durante 30 minutos. Para eliminar ocoques de cocidos aplicar 3-4 L/100 L de agua durante2 horas. En caso de desinfección de virus encapsulados usar 1 L/100 L de agua durante 1 hora.	1 L 5 L
GLUTALVEEX QUATS Solución	Glutaraldehído150 mg Cloruro de didicildimetil amonio100 mg Contiene aceite esencial de Citronela Excipientes csp1 ml	--	3 ml/L de agua para tratar 10 m². Para el control del virus de la PPA administrar 5 ml/L de agua y aplicar 3 L de solución por cada 10 m².	1 L 5 L
GLUTEX Solución	Glutaraldehído40 mg Gloxal32 mg Cloruro de didicildimetil amonio100 mg Excipientes csp1 ml	--	Pulverización-nebulización, aspersión-rociado o lavado a razón de 1 L/200 L de agua.	1 L 5 L 1 galón
YODORVEEX Solución	Yodo25 mg Excipientes csp1 ml	--	Suelos, paredes y equipo: 10-50 ml/L de agua. Pulverización manual ó automática: 25 ml/m². Pedituvios: 10-50 ml/L de agua.	1 L 5 L



CATÁLOGO
GENERAL
.....

PRODUCTOS MEDICINALES VETERINARIOS



REVEEX
Av. Antón Phillips, cruce con calle El Canal - Complejo Industrial Reveex - Zona Industrial La Hamaca
MARACAY - ESTADO ARAGUA - VENEZUELA
Tel: +58-243-551,54,32 /64,03/68,52/69,76 - Fax: +58-243-551,68,53 - Página web: <http://www.reveex.com/laboratorios>

Laboratorios **REVEEX** dispone de catálogos específicos
de productos para acuicultura y tripanocidas

