



Catálogo de productos

2026

SOLUCIONES INTEGRALES
PARA LA GANADERÍA



INJECTABLE

ANAPOX 200 L.A.

OXITETRACICLINA HCL

200 MG



¡Escanea
y descubre más!

ANAPOX 200 L.A.

ANTIBIÓTICO

500 ml



250 ml



100 ml



Está indicado para el tratamiento de patologías causadas por microorganismos sensibles a la **Oxitetraciclina**, abarcando cuadros de anaplasmosis, neumonía, mastitis, metritis, pasteurelosis y septicemia hemorrágica, heridas infectadas e infecciones de ombligo.



Acción prolongada
con menos manejo



Control total
de infecciones mixtas



Máxima potencia y
recuperación sostenida

Dosificación recomendada:
20mg/kg P.V. **(1 ml/10kg P.V.)**

Tiempo de retiro:

Carne: 22 días después de la última aplicación.

Leche: 7 días después de la última aplicación.



ORAL

COLKUM

COLISTINA SULFATO

300.000 UI



¡Escanea
y descubre más!



COLKUM

ANTIBIÓTICO



Antibiótico oral diseñado para el control y tratamiento de **infecciones digestivas y respiratorias**. Su fórmula especializada actúa con máxima precisión en el tracto intestinal de aves y lechones, garantizando una recuperación rápida de la parvada o camada.



Especialista
en salud intestinal



Fácil administración



Protección total
con doble acción

Dosificación recomendada:
75.000UI/kg (por 3 días)

Tiempo de retiro:
6 días antes del sacrificio de los animales destinados
al consumo humano.



PHK



INYECTABLE

ENROKUM 5%

ENROFLOXACINA BASE

50 MG



¡Escanea
y descubre más!



ENROKUM 5%

ANTIBIÓTICO

100 ml



10 ml



Antibacteriano sintético de amplio espectro con rápida acción bactericida. Está indicado para el tratamiento de infecciones sistémicas y localizadas causadas por gérmenes **Gram-positivos, Gram-negativos y micoplasmas** en una amplia variedad de especies animales.



Amplio campo de uso



Rápida acción antibiótica



Seguridad toxicológica

Dosificación recomendada:
5mg/kg P.V. **(1ml/10kg P.V.)**



FLORKUM 30

FLORFENICOL

300 MG



¡Escanea
y descubre más!

FLORKUM 30

ANTIBIÓTICO

100 ml



10 ml



Antibiótico inyectable de alta concentración a base de **Florfenicol**, diseñado para el tratamiento de enfermedades respiratorias, reproductivas, locomotoras y septicemias. Su fórmula ofrece un **control eficaz sobre patógenos Gram-positivos y Gram-negativos**.



Amplio espectro y eficacia
en patologías clave



Comodidad en el tratamiento
y menor manejo



Formulación concentrada
y menos invasiva

Dosificación recomendada:

20mg/kg P.V. **(1.5ml/20kg P.V.)**. Cada 48 horas.

Tiempo de retiro (Período de supresión):

28 días (No destinar a consumo humano la carne de animales tratados antes de este período).



 **INYECTABLE**

GENTAK

GENTAMICINA

100 MG



**¡Escanea
y descubre más!**

GENTAK

ANTIBIÓTICO



Antibiótico de amplio espectro del grupo de los aminoglucósidos, indicado para el tratamiento de infecciones sistémicas en los aparatos gastrointestinal, respiratorio y genitourinario. Su acción bactericida actúa mediante la inhibición de la síntesis proteica, **eliminando eficazmente una extensa gama de bacterias Gram-positivas y Gram-negativas.**



Cobertura integral
de amplio espectro



Rápida absorción desde
el sitio de aplicación



Excelente biodisponibilidad
superior al 90%

Dosificación recomendada:

Bovinos: 5mg/kg P.V. **(1ml/20kg P.V.)**

Cerdos: 2.2mg/kg P.V.

Equinos: 5mg/kg P.V.

Tiempo de retiro:

Carne: 30 días después de la última aplicación del producto.



INJECTABLE

LEPTOK 50

DIHIDROESTREPTOMICINA

500 MG



¡Escanea
y descubre más!

LEPTOK 50

ANTIBIÓTICO



Antibiótico bactericida inyectable de alta concentración a base de dihidroestreptomicina. Está específicamente indicado para el tratamiento de la **Leptospirosis** y diversas patologías infecciosas respiratorias, reproductivas y sistémicas en vacunos y porcinos.



Potencia específica
contra la Leptospirosis



Tratamiento integral
de patologías críticas



Alta concentración
y eficiencia en la dosis

Dosificación recomendada:

Leptospirosis:

A razón de 25mg/kg P.V. **(1ml/20kg P.V.)**

A razón de 50mg/kg P.V. **(1ml/10kg P.V.)**

Tiempo de retiro:

Carne: 30 días después de la última aplicación del producto.

Leche: 72 horas después de la última aplicación del producto.



INYECTABLE

SPRIX

ESPIRAMICINA ADIPATO

600.000 UI



¡Escanea
y descubre más!

SPRIX

ANTIBIÓTICO



Antibiótico macrólido de segunda generación a base de Espiramicina (adipato) con **excepcional capacidad de penetración tisular**. Su formulación inyectable está específicamente diseñada para alcanzar concentraciones superiores en el sistema respiratorio y la glándula mamaria en bovinos, porcinos, ovinos y caprinos. Experto de acción comprobado vs. cocos gram+.



Efecto Post-Antibiótico
(PAE) prolongado



Afinidad tisular selectiva
y máxima penetración



Periodo de retiro optimizado
y rápida absorción

Dosificación recomendada:
30.000 UI/kg P.V. **(1ml/20kg P.V.)**

Tiempo de retiro:

Carne: 72 horas después de la última aplicación del producto.

Leche: 72 horas después de la última aplicación del producto.



 **INYECTABLE**

TILVIX 20

TILOSINA TARTRATO

200 MG



**¡Escanea
y descubre más!**

TILVIX 20

ANTIBIÓTICO



Antibiótico macrólido inyectable a base de Tilosina. Posee una acción selectiva contra bacterias **Gram-positivas, espiroquetas** y una eficacia sobresaliente contra **Mycoplasma spp.**, siendo un pilar fundamental en el tratamiento de afecciones respiratorias.



Excepcional difusión
en tejido pulmonar



Eficacia superior
contra Micoplasmas



Dosificación optimizada
y alta jeringabilidad

Dosificación recomendada:

Bovinos adultos: 20mg/kg P.V. **(1ml/10kg P.V.)**

Becerras y mautes: **(1ml/20kg P.V.)**


Tiempo de retiro:

Carne: 8 días antes del sacrificio.

Leche: 96 horas después del último tratamiento.



www.pharmakum.com



CICLONAC

DICLOFENAC SÓDICO

50 MG



¡Escanea
y descubre más!

CICLONAC

ANTIINFLAMATORIO NO ESTEROIDEO



Antiinflamatorio no esteroideo (**AINE**) con potentes propiedades analgésicas, antiinflamatorias y antipiréticas. Está indicado para el manejo integral del dolor, la fiebre y la inflamación en procesos traumatológicos, post-operatorios, desórdenes músculo-esqueléticos y como coadyuvante en el tratamiento de infecciones sistémicas.



Acción inmediata en procesos agudos y crónicos



Alta potencia con perfil de seguridad optimizado



Versatilidad terapéutica y efecto coadyuvante

Dosificación recomendada:
1mg/kg P.V. (**1ml/50kg P.V.**)

Tiempo de retiro:

Leche: 3 días después de la última aplicación.

Carne: 10 días después de la última aplicación.



PHK



INYECTABLE

FLUNIK

FLUNIXIN MEGLUMINA

50 MG



¡Escanea
y descubre más!

FLUNIK

ANTIINFLAMATORIO NO ESTEROIDEO

100 ml



50 ml



Antiinflamatorio no esteroideo (**AINE**) inyectable a base de Flunixin Meglumina, con potentes propiedades analgésicas y antipiréticas. Está formulado para el control del dolor agudo, la inflamación y la fiebre asociados a afecciones de la musculatura lisa, respiratorias y cuadros endotóxicos en diversas especies de producción.



Alivio sintomático veloz del dolor, la inflamación y la fiebre



Control especializado de la endotoxemia y el dolor visceral



Versatilidad y seguridad terapéutica multiespecie

Dosificación recomendada:
2.2mg/kg P.V. **(4ml/100kg P.V.)**

Tiempo de retiro:

Bovinos (Leche): 5 días después de la última aplicación.

Bovinos (Carne): 7 días después de la última aplicación.

Porcinos: 21 días después del último tratamiento.



INJECTABLE

KEXA

DEXAMETASONA FOSFATO SÓDICA

2 MG



¡Escanea
y descubre más!

KEXA

ANTIINFLAMATORIO ESTEROIDEO

100 ml



10 ml



Corticoide inyectable de alta solubilidad con potentes propiedades antiinflamatorias, antialérgicas y antirreumáticas. Su formulación como sal fosfato sódica garantiza una **absorción inmediata**, siendo indispensable en el tratamiento de procesos inflamatorios agudos, estados de shock y reacciones alérgicas severas.



Alta solubilidad
y absorción inmediata



Potente actividad
antiinflamatoria glucocorticoide



Manejo especializado de
estados de shock y alergias

Dosificación recomendada:

Bovinos y equinos: **5mg/kg P.V.**

Caninos: **(0.025-1ml/kg P.V.)**

Felinos: **(0.05-0.15ml/kg P.V.)**

No utilizar en animales gestantes.

Tiempo de retiro:

Carne: 5 días después de la última aplicación.

Leche: 3 días después de la última aplicación.



GUSAK

CIPERMETRINA TÉCNICA + OXITETRACICLINA
VIOLETA DE GENCIANA



**¡Escanea
y descubre más!**

GUSAK

ANTIBIÓTICO

ANTISÉPTICO



Solución tópica en aerosol con acción **insecticida, larvícida y antibiótica** de amplio espectro. Está formulado para el tratamiento y prevención de miasis (gusaneras) e infecciones cutáneas, combinando el poder del control parasitario con la reparación tisular y la desinfección local.



Acción antibiótica
y larvícida local



Reparación tisular
y protección antiséptica



Seguridad toxicológica
y ambiental

Tratamiento recomendado:

Aplicación tópica. **Rociar el aerosol sobre la parte afectada**, repitiendo el tratamiento de acuerdo a la gravedad de la lesión o según juicio del Médico Veterinario.



PHK



KIVER SPRAY

IVERMECTINA

0,25 G



¡Escanea
y descubre más!



KIVER SPRAY

ECTOPARASITICIDA



Solución de ivermectina para uso tópico localizada, formulada en un vehículo especial que favorece la cicatrización sin absorción transdérmica. Está indicado para la **prevención y tratamiento de miasis, sarnas y la cura de heridas quirúrgicas o accidentales** en diversas especies, garantizando una acción externa segura que no interfiere con otros protocolos sistémicos.



Acción tópica directa con alta seguridad sistémica



Efecto cicatrizante y protector de tejidos



Control especializado de miasis y ectoparásitos

Tratamiento recomendado:

Aplicación tópica. **Rociar el aerosol sobre la parte afectada**, en casos de *miasis*, aplicar a 15cm de la lesión (diariamente hasta la regeneración del tejido). En caso de *sarna sarcoptica* y *demodécica*, aplicar a 15cm la lesión (repetir diariamente por 25 días).




PHK



POMADA

NEOK POMADA

SULFATO DE NEOMICINA + DEXAMETASONA
CLOTRIMAZOL



¡Escanea
y descubre más!



NEOK POMADA

ANTIMICÓTICA

ANTIBACTERIANA

ANTIINFLAMATORIA

50 gr



15 gr



Pomada de uso tópico con triple acción: **antimicótica, antibacteriana y antiinflamatoria**. Está formulada para el tratamiento integral de afecciones cutáneas complicadas por infecciones o procesos alérgicos, favoreciendo la regeneración del tejido afectado en diversas especies animales.



Efecto terapéutico
de triple acción



Capacidad de absorción
y cicatrización óptima



Alta penetración tisular
y seguridad multiespecie

Tratamiento recomendado:

- Previo a la aplicación, limpie la zona afectada.
- Aplique **NEOK POMADA** sobre el área afectada **dos veces al día**.
- Continúe el tratamiento hasta su completa cicatrización.



PHK



INYECTABLE

TRIBAX 7%

DIMINACENO DIACETURATO + ANTIPIRINA



¡Escanea
y descubre más!



TRIBAX 7%

HEMOPARASITICIDA



Solución inyectable de alta eficacia formulada con **Diminaceno Diaceturato y Antipirina** para el control y tratamiento de enfermedades causadas por hemoparásitos (*Trypanosoma* sp. y *Babesia* sp.). Su acción combinada permite la **eliminación directa del agente patógeno y la estabilización inmediata de los signos clínicos** en bovinos, ovinos, caprinos y equinos.



Efecto sinérgico dual
y recuperación clínica



Amplio espectro hemotrópico



Restablecimiento rápido
del consumo y peso

Dosificación recomendada:
3,5mg/kg P.V. **(1ml/20kg P.V.)**

Tiempo de retiro:

Carne: 7 días después de la última aplicación.

Leche: 7 días después de la última aplicación.



INYECTABLE

HEMOSEK

CLORURO DE ISOMETAMIDIUM HCL
OXITETRACICLINA HCL + ANTIPIRINA



¡Escanea
y descubre más!

HEMOSEK

HEMOPARASITICIDA

250 ml



100 ml



Solución inyectable de alta eficacia diseñada para el control integral de la **Tripanosomosis y la Anaplasmosis**. Su fórmula combina la acción tripanocida del Isometamidium, el poder antibiótico de la Oxitetraciclina y el efecto antipirético de la Antipirina, permitiendo un manejo completo del cuadro clínico y la fiebre. **Incluye diluyente estéril.**



Control sinérgico de
infecciones hemoparasitarias



Efecto profiláctico
y curativo prolongado



Rápida recuperación
clínica y productiva

Dosificación recomendada:
0,5mg/kg P.V. **(1ml/20kg P.V.)**

Tiempo de retiro:
21 días después de la última aplicación.



INJECTABLE

ISOKUM

C L O R U R O D E I S O M E T A M I D I U M


2 0 M G



¡Escanea
y descubre más!

ISOKUM

HEMOPARASITICIDA



Hemoparasitocida inyectable a base de Cloruro de Isometamidiumal 2%. Está indicado para el tratamiento preventivo y curativo de la **Tripanosomosis** causada por Trypanosoma spp. en animales de producción, garantizando la máxima potencia del principio activo tras su reconstitución. **Incluye diluyente estéril.**



Acción preventiva y curativa
de larga duración



Reducción del impacto económico
en la producción



Fórmula extemporánea
y presentaciones adaptables

Dosificación recomendada:

1mg/kg P.V. **(1ml/20kg P.V.)**

Tiempo de retiro:

21 días después de la última aplicación.



 **INYECTABLE**

KUMDORA

DORAMECTINA

10 MG



**¡Escanea
y descubre más!**

KUMDORA

ENDECTOPARASITICIDA

500 ml



100 ml



Endectocida inyectable de alta potencia a base de Doramectina, diseñado para el tratamiento y control integral de **parásitos internos y externos**. Su mecanismo de acción provoca la parálisis y muerte de nematodos gastrointestinales, pulmonares y diversos ectoparásitos en bovinos, ovinos, caprinos y porcinos.



Control endectocida
de amplio espectro



Alta potencia y efecto
residual prolongado



Maximización de la productividad
y bajo volumen de dosis

Dosificación recomendada:

Bovinos, ovinos, caprinos: **(1ml/50kg P.V.)**

Porcinos: **(1ml/33kg P.V.)**

Tiempo de retiro:

Bovinos (Carne): 42 días después de la última aplicación.

Ovinos y Caprinos (Carne): 35 días después de la última aplicación.

Porcinos: 28 días después de la última aplicación.



 **INYECTABLE**

KIVER

IVERMECTINA

10 MG



**¡Escanea
y descubre más!**

KIVER

ENDECTOPARASITICIDA

500 ml



100 ml



10 ml



Endectocida inyectable de amplio espectro a base de Ivermectina al 1%. Su mecanismo de acción actúa sobre los canales de cloruro de los parásitos, provocando un bloqueo neuromuscular que garantiza la **eliminación de nematodos gastrointestinales, pulmonares y diversos ectoparásitos.**



Control integral de parásitos internos
y prevención especializada



Optimización del rendimiento
productivo y calidad cárnica



Manejo ambiental y control
de vectores en heces

Dosificación recomendada:

Bovinos, ovinos y caprinos: **(1ml/50kg P.V.)**

Cerdos: **(1ml/33kg P.V.)**

Tiempo de retiro:

Carne: 30 días después de la última aplicación.



PHK



INYECTABLE

KIVER 3,15%

IVERMECTINA

31,5 MG



¡Escanea
y descubre más!

KIVER 3,15%

ENDECTOPARASITICIDA

500 ml



100 ml



Endectocida inyectable de alta concentración y acción prolongada a base de Ivermectina al 3,15%. Está diseñado específicamente para el tratamiento y control sostenido de **nematodos gastrointestinales y pulmonares, piojos, ácaros de la sarna, garrapatas y larvas causantes de miasis en bovinos.**



Acción prolongada
y control extendido



Solución endectocida integral
de amplio espectro



Optimización de parámetros
productivos y bienestar

Dosificación recomendada:
(1ml/50kg P.V.)

Tiempo de retiro:

Carne: 122 días después de la última aplicación.



 **INYECTABLE**

KUMEC AD3E

IVERMECTINA + VITAMINA A, D3 Y E



**¡Escanea
y descubre más!**

KUMEC AD3E

ENDECTOCIDA VITAMINADO

500 ml



250 ml



100 ml



10 ml



Solución inyectable endectocida potenciada con vitaminas A, D3 y E, indicada para el tratamiento y control de parásitos internos y externos en bovinos, ovinos, caprinos y porcinos. Su fórmula no solo **elimina la carga parasitaria**, sino que también **compensa las deficiencias vitamínicas derivadas**, estimulando activamente la recuperación y la productividad del animal.



Acción endectocida de amplio espectro y eficacia sostenida



Sinergia vitamínica para la reparación tisular y fertilidad



Optimización del metabolismo y ganancia de peso

Dosificación recomendada:

Bovinos, caprinos y ovinos: **(1ml/50kg P.V.)**

Porcinos: **(1ml/33kg P.V.)**

Tiempo de retiro:

Carne y leche: 28 días después de la última aplicación.



INYECTABLE

OXITOCINA

OXITOCINA

20 UI



¡Escanea
y descubre más!

OXITOCINA

HORMONA SINTÉTICA



Hormona sintética (nonapéptido) con acción selectiva sobre la musculatura lisa del útero y las glándulas mamarias. Está indicada en diversas especies para la **inducción y aceleración del parto**, el control de **hemorragias postparto**, la **expulsión de membranas fetales (primeras 6 horas postparto)** y la **estimulación de la eyección láctea**.



Estimulación de la dinámica uterina en parto y posparto



Facilitación de la involución y limpieza uterina



Inducción de la eyección láctea

Dosificación recomendada:

Vacas y yeguas:

Obstétrica: (primeras 6 horas de parto) 80-100UI **(4-5ml)**.

Eyección láctea: (previo a la rutina de ordeño) 20UI **(1ml)**.

Cerdas: **(1-2,5ml)**.

Ovejas, cabras y caninos: **(0,25-1ml)**.

Felinas: **(0,2-0,5ml)**.



PHK



INYECTABLE

3VITREX AD₃E

VITAMINAS A, D₃ Y E



¡Escanea
y descubre más!

3VITREX AD3E

COMPLEJO VITAMÍNICO

500 ml



250 ml



100 ml



Complejo vitamínico inyectable liposoluble diseñado para la prevención y el tratamiento de carencias de Vitaminas A, D3 y E. Está específicamente indicado para periodos de alto requerimiento y estrés productivo, actuando como un **soporte esencial para el metabolismo óseo, la integridad epitelial y la función reproductiva** en diversas especies.



Optimización de la fertilidad
y protección antioxidante



Regulación del metabolismo
mineral y salud ósea



Integridad de mucosas
y soporte inmunológico

Dosificación recomendada:

Vacas y toros: **5ml**

Mautes y novillos: **3-5ml**

Porcino adultos, ovinos y caprinos: **1-3ml**

Lechones: **0,5-1ml**



INYECTABLE

MASSAK 50

UNDECILENATO DE BOLDENONA

50 MG



¡Escanea
y descubre más!

MASSAK 50

ANABÓLICO

250 ml



Solución inyectable a base de Undecilenato de Boldenona, un esteroide anabólico de acción prolongada derivado de la testosterona. Está diseñado para **optimizar el estado general** de animales debilitados mediante la promoción de la síntesis proteica y la retención de nitrógeno en el organismo.



Incremento de la masa muscular
y desarrollo óseo



Optimización metabólica
y estimulación del apetito



Acción prolongada y restauración
del estado general

Dosificación recomendada:

Equinos: (1ml/90kg P.V.)

Caninos: (0,25ml/5kg P.V.)



ORAL

LIVEK PROTEC

VITAMINAS B1, B2, B3, B6, B12, C, D-PANTENOL, METIONINA, LISINA, TRIPTÓFANO Y CLORURO DE COLINA



¡Escanea
y descubre más!

LIVEK PROTEC

COMPLEJO MULTIVITAMÍNICO



Complejo multivitamínico y de aminoácidos de uso oral diseñado específicamente para aves de producción. Su fórmula con vitaminas del grupo B, vitamina C y nutrientes clave **optimiza el metabolismo energético, fortalece el sistema inmunológico y promueve el equilibrio neuromuscular y hepático** en sistemas de producción intensiva.



Optimización del desarrollo corporal y rentabilidad



Fortalecimiento inmunológico y mitigación del estrés



Soporte al metabolismo energético y equilibrio hepático

Dosificación recomendada:

Aves adultas: **2ml** por Litro de agua de bebida (durante 7 días).

Aves jóvenes: **1ml** por Litro de agua de bebida (durante 7 días).



Juntos
dejamos
huella